

Vos bejagen, beschermt jouw kleinvee niet

De vossenjacht is geen oplossing om schade aan kleinvee te voorkomen:

1. Vossen zijn territoriale dieren en reguleren zo hun aantal per oppervlakte zelf. Op een bepaalde oppervlakte is maar ruimte voor een beperkt aantal vossen en vossenfamilies. Hierdoor kunnen nooit "vossenplagen" ontstaan, in tegenstelling tot bij knaagdieren. Enkel wanneer er meer voedsel is, kan het aantal vossen iets hoger liggen. Zoals in jaren met zeer veel muizen of konijnen. Te weinig voedsel leidt tot minder vossen.
2. Wanneer vossen worden bejaagd, komen territoria vrij voor andere, meestal jongere vossen. Die jonge dieren zijn minder dominant. Ze verdedigen minder de territoriumgrenzen en bezetten kleinere territoria. Hierdoor kunnen er meer vossen op eenzelfde oppervlakte (over)leven.
3. Sterfte in een vossenpopulatie – bijvoorbeeld door bejaging – stimuleert de voortplanting. Er worden grotere nesten geworpen en meer vossenjongen overleven. Het oorspronkelijk hoger sterftecijfer wordt op die manier gecompenseerd.
4. Een bejaagde vossenpopulatie is onstabiel en zorgt voor blijvende onrust. De dieren wisselen daardoor gemakkelijk van territorium of verleggen hun grenzen, het komt vaker tot (agressieve) contacten tussen vossen en jonge dieren zwermen uit over grotere afstanden.

Het bejagen van vossen is niet effectief. Integendeel, het werkt problemen met vossen in de hand en verhoogt de druk op mens en natuur.

In Vlaanderen mag de vos tijdens het jachtseizoen onder strikte voorwaarden worden bejaagd. Vossenjacht of -bestrijding is evenwel verboden tussen zonsondergang en -opgang. De jacht mag niet plaatsvinden op of rond een vossenburcht. Het gebruik van gif, stroppen en klemmen is eveneens niet toegelaten. In bepaalde gevallen is een bijzondere bejaging mogelijk buiten het jachtseizoen. Neem hiervoor contact op met het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) (www.natuurenbos.be).



Vossen en ziekten een overschat probleem

Vossen kunnen drager zijn van ziekten. Hou rekening met onderstaande voorzorgsmaatregelen om besmetting te vermijden.

Vossenlintworm

De vossenlintworm is een lintworm die de vos binnenkrijgt door besmette knaagdieren te eten. Lintwormen kunnen via de uitwerpselen van de vos de mens besmetten. De kans op besmetting is in Vlaanderen erg klein en te voorkomen door:

- dode vossen of hun uitwerpselen niet met de blote hand aan te raken;
- geen ongewassen vruchten of ongewassen rauwe groenten te eten die zich lager dan 70 cm van de grond bevinden;
- honden nooit in een vossenburcht te laten neuzen. Zo voorkom je dat vossenlintwormeitjes in hun vacht blijven hangen. Vermijd ook contact met jachthonden;
- na het wroeten in bos, tuin of natuur jouw handen zorgvuldig te wassen.

Honden en katten kunnen eveneens met deze lintworm besmet zijn en ze doorgeven. Vooral dieren die vaak in de natuur rondlopen en knaagdieren eten, hebben een verhoogd risico. Ontworm daarom je huisdieren regelmatig (driemaandelijks).

Bejaging van vossen leidt tot een verhoogde mobiliteit van vossen en werkt verspreiding van ziekten in de hand!

Hondsdolheid

Door orale vaccinatie van vossen, in Wallonië en in onze buurlanden, is België sinds 2001 volledig vrij van hondsdolheid. In Vlaanderen is hondsdolheid bij vossen overigens nooit een probleem geweest (met uitzondering van Voeren).



BIJKOMENDE INFORMATIE

Deze brochure is ook digitaal beschikbaar. Besturen en organisaties die hun inwoners willen informeren over de vos en in het bijzonder hoe ze kleinvee kunnen beschermen, kunnen contact opnemen met Natuurpunt of Vogelbescherming Vlaanderen.



MEER INFORMATIE OVER DE VOS VIND JE OP:

www.zoogdierenwerkgroep.be
www.natuurpunt.be
www.vogelbescherming.be
www.inbo.be
www.natuurenbos.be
www.sos-vos.be

Deze informatiebrochure kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen en Velt.

Slimmer dan de vos






Tips voor een veilige kippenren

- Gebruik stevig gaas (min 1,5 mm dik), daar bijten vossen en marters niet door
- Voorzie een maasgrootte van maximaal 3x3 cm, onderaan kan je eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken
- Vermijd dat vossen de kippenren binnen kunnen via overhangende bomen of andere opstapjes
- Zorg dat de draad goed gespannen staat.
- Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan.



Zorg voor een hoogte van minimaal 180 cm en plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten in een hoek van 30°. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm.



De vos is vooral 's nachts op pad. Zorg voor een (automatisch) afsluitbaar nachthok.

Leg rondom de buitenzijde een rij tegels van minimum 40 cm breed of graaf de omheining 50 cm diep in

Door een maasgrootte van max. 1,5x1,5 cm te gebruiken, raken ook marters er niet doorheen. Eventueel overspannen met een stevig net maakt je afsluiting meteen ook volledig marterproof.



Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest. Parallel hiermee zijn de klachten over pluimveeroven toegenomen.

Leren samenleven

Vlaanderen is sterk versnipperd en dichtbevolkt. Door hun groot aanpassingsvermogen en de relatief grote oppervlakte van hun territoria, laten vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.

Een vos kiest graag voor de minste inspanning. Slecht afgesloten kippenhokken en konijnenrennen zijn daarom geliefkoosde plekken voor een feestmaal. Gelukkig kan een goed beveiligd hok een slachtpartij voorkomen. Wees slimmer dan de vos en volg de aanbevelingen in deze brochure!



Bescherm jouw kippen tegen de vos

Vossen zijn erg behendig. Zorg dat zij niet tot bij de kippen, eenden of konijnen kunnen komen. Vossen zijn overwegend nachtdieren. Je kleinvee 's nachts huisvesten in een nachthok met een vaste bodem kan de meeste schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt.

Vermijd rondslingerend afval door stevige afvalcontainers te plaatsen.

Als je deze maatregelen uitvoert, voldoet jouw nachthok of ren aan de minimale vereisten van de Code goede praktijk zoals vastgelegd bij ministerieel besluit.

Feiten en cijfers

De vos behoort tot de familie van de hondachtigen. Een volwassen vos heeft een kop-romplengte van 60 tot 90 cm en een pluimstaart van 30 tot 50 cm. Kenmerkend is zijn roodbruine vacht in combinatie met een grijs-witte keel en buik.

Vossen zijn territoriale dieren. Dat wil zeggen dat ze een gebied afbakenen waar ze in principe geen soortgenoten dulden. Zo'n territorium is meestal 5 tot 10 km² groot, maar kan in stedelijk gebied kleiner zijn. In een territorium leeft gewoonlijk één mannetje met één of enkele vrouwtjes. Per territorium is er slechts één nest per jaar, dat meestal 4 tot 6 jongen telt.

Vossen zijn vooral in het schemerdonker en 's nachts actief.

Nuttige dieren

Vossen eten veel kleine zoogdieren zoals ratten, muizen en konijnen. Net die soorten kunnen schade toebrengen aan landbouwgewassen. De vos is dus een partner in het beperken van landbouwschade. Daarnaast ruikt hij ook heel wat zieke dieren en kadavers op.

